La consommation régulière d?une faible dose d?aspirine réduit les risques de cancer

Par ***mogirard***
Créé le ***08/06/2017 - 13:21***

La consommation régulière d?une faible dose d?aspirine réduit les risques de cancer

Jeudi, 08/06/2017 - 12:21 0 commentaire

- Diminuer la police
- Augmenter la police
- Imprimer
- Version PDF

-
- Tweeter
-
-

0 avis :

zoom

Une vaste analyse sur plus de 100 000 personnes suivies pendant une trentaine d?années confirme l?effet protecteur de la consommation de faibles doses d?aspirine à long terme. Globalement, consommer entre 0,5 comprimé (162,5 mg) et 7 comprimés (2.275 mg) d?aspirine standard (325 mg) par semaine pendant au moins 6 ans a été associé à une baisse de la mortalité totale de 7 % chez les femmes et de 11 % chez les hommes. Or, cette baisse serait principalement liée au moindre risque de mortalité par cancer : - 7 % chez les femmes et - 15 % chez les hommes.

« Cette réduction de la mortalité par cancer peut sembler modeste mais elle est comparable au sur-risque de décès par cancer lié à l?obésité », a expliqué le Docteur Yin Cao (Massachusetts General Hospital et Harvard Medical School, Boston, Etats-Unis). Bien que plusieurs travaux aient déjà montré une association entre l?aspirine et une baisse du risque de mortalité, notamment par cancer, il s?agit de la première fois que les bénéfices de l?aspirine sur la mortalité globale et sur la mortalité par cancer sont évalués dans deux grandes cohortes prospectives sur le long terme.

Parmi les cancers, la réduction du risque de mortalité était plus prononcée pour les cancers colorectaux : - 31 % pour les femmes et - 30 % pour les hommes mais elle était également importante pour les cancers du sein, de la prostate et du poumon.

La consommation d?aspirine a été évaluée à l?entrée dans les études et tous les deux ans avec un suivi de plus de 90 %. Au cours du suivi, 22 094 femmes et 14 749 hommes sont décédés, dont 8 271 femmes et 4 591 hommes d?un cancer. Les bénéfices associés à l?aspirine sont apparus dès la consommation de 0,5 à 1,5 comprimé de 325 mg par semaine, soit l?équivalent d?une aspirine par jour à faible dose par semaine pendant au moins 6 ans chez les hommes comme chez les femmes.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Medical Daily

Noter cet article :

Recommander cet article :

-
- Tweeter
-

- **Nombre de consultations :** 622
- **Publié dans :** Médecine
- **Partager :**
  - Facebook
  - Viadeo
  - Twitter
  - Wikio

Médecine aspirine cancer cellules côlon inflammation mortalité poumon prostate

---

URL source: https://www.rtflash.fr/consommation-reguliere-d-faible-dose-d-aspirine-reduit-risques-cancer/article