

Maladie d'Alzheimer : un patient sur deux ne souffre que d'une démence légère

Par *mogirard*

Créé le 02/03/2021 - 09:13

Maladie d'Alzheimer : un patient sur deux ne souffre que d'une démence légère

Mardi, 02/03/2021 - 08:13 [0 commentaire](#)

- [Diminuer la police](#)
- [Augmenter la police](#)
- [Imprimer](#)
- [Version PDF](#)

•

- [Tweeter](#)

•

•

0 avis :



[zoom](#)

Une étude menée par les chercheurs de l'Université de Boston (Etats-Unis) a montré que le fait de déclencher la maladie d'Alzheimer ne signifiait pas forcément souffrir d'une grave démence. Ces travaux montrent que plus de la moitié des cas de la maladie d'Alzheimer souffrent de légères démences et seul un patient sur cinq représente un cas de démence grave.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs se sont intéressés aux données de la Framingham Heart Study (FHS), une étude épidémiologique américaine au long cours qui a débuté en 1948. Les personnes participant au FHS ont entre 50 et 94 ans et sont susceptibles de développer des troubles cognitifs légers et la maladie d'Alzheimer. Pour cette recherche, les chercheurs ont ciblé les personnes souffrant d'Alzheimer et de troubles cognitifs légers sur trois fenêtres temporelles: 2004-2005, 2006-2007 et 2008-2009.

En analysant les résultats, ils se sont aperçus que 50,4 % des participants retenus souffrant de la maladie d'Alzheimer étaient des cas légers de démence, qu'un peu moins d'un tiers (30,3 %) des cas sont

modérés et 19,3 % sont des cas graves. Parmi tous les participants atteints de troubles cognitifs légers et de la maladie d'Alzheimer, le pourcentage mis en commun était de 45,2 % pour le groupe combiné de démence légère et de troubles cognitifs légers qui ont ensuite évolué vers la maladie d'Alzheimer.

« L'intervention précoce dans les cas de troubles cognitifs légers ou de démence légère a été le principal objectif de la recherche sur la maladie d'Alzheimer et du développement de médicaments au cours des dernières années », indique Rhoda Au, professeur d'anatomie et de neurobiologie à la faculté de médecine de l'Université de Boston et auteur correspondant de l'étude. **« Nous avons constaté qu'environ 45 % des personnes atteintes de troubles cognitifs ou ayant reçu un diagnostic de démence associée à la maladie d'Alzheimer avaient une maladie d'Alzheimer précoce. Nos résultats servent à éclairer la conception des futures études de recherche, telles que les études cliniques et d'observation, et permettent une allocation optimale des ressources pour l'élaboration des politiques ».**

De plus, pour les chercheurs, le fait que la moitié des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer souffrent d'une maladie légère souligne la nécessité d'effectuer des recherches et des interventions pour ralentir le déclin ou prévenir la progression de la maladie.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

[IOS](#)

Noter cet article :

Recommander cet article :

-
- [Tweeter](#)
-

- **Nombre de consultations :** 0
- **Publié dans :** [Neurosciences & Sciences cognitives](#)
- **Partager :**
 - [Facebook](#)
 - [Viadeo](#)
 - [Twitter](#)
 - [Wikio](#)

[Neurosciences & Sciences cognitives Alzheimer cerveau déclin démence maladies](#)

URL source: <https://www.rtfash.fr/maladie-d-alzheimer-patient-sur-deux-ne-souffre-que-d-demence-legere/article>