

Le tabagisme passif est toujours dangereux pour les artères

Par *admin*

Créé le 27/07/2001 - 23:00

Le tabagisme passif est toujours dangereux pour les artères

Vendredi, 27/07/2001 - 22:00 [0 commentaire](#)

- [Diminuer la police](#)
- [Augmenter la police](#)
- [Imprimer](#)
- [Version PDF](#)

•

- [Tweeter](#)

•

•

0 avis :



[zoom](#)

Le tabagisme passif même léger, comme par exemple une simple exposition de 30 minutes à la fumée de cigarettes, est dangereux pour les artères, affirment des chercheurs japonais dans une étude publiée le 25-07- dans le Journal of the American Medical Association (JAMA). Les Dr Ryo Otsuka et Hiroyuki Watanabe et leurs collègues de la faculté de médecine de l'Université d'Osaka (Japon) ont examiné les effets du tabagisme passif sur la circulation coronarienne de 30 sujets en bonne santé, se répartissant entre fumeurs et non-fumeurs. Ils ont constaté qu'une simple exposition d'une demi-heure à la fumée de cigarettes provoquait un dysfonctionnement des cellules endothéliales. Ces cellules tapissent les parois des cavités du coeur et des vaisseaux sanguins et favorisent la vasodilatation (augmentation du diamètre des vaisseaux) et donc l'accroissement du flux sanguin. "Ces données révèlent que le tabagisme passif temporaire réduit (le flux sanguin) chez les non-fumeurs mais ne l'affecte pas chez les fumeurs actifs. Cela fournir la preuve directe de l'effet nocif du tabagisme passif sur la circulation coronarienne chez les non-fumeurs", affirment les auteurs de l'étude. Cette étude illustre les conséquences néfastes du tabagisme passif pour le coeur. Le dysfonctionnement des cellules endothéliales est un signe précurseur de l'athérosclérose (rétrécissement et durcissement des artères). Elle montre l'importance qu'il y a à protéger quiconque de l'exposition au tabagisme passif, soulignent deux chercheurs américains, les Dr

Stanton Glantz et William Parley, de l'Université de San Francisco (Californie). Selon l'Association américaine du coeur (AHA), les personnes exposées au tabagisme passif ont 30 % de risques en plus de mourir de maladies cardiovasculaires que celles vivant dans un environnement sans tabac.

Brève rédigée par @RT Flash

JAMA :

<http://jama.ama-assn.org/issues/v286n4/ffull/jtw10024.html>

Noter cet article :

Recommander cet article :

-
- [Tweeter](#)
-

- **Nombre de consultations :** 117
- **Publié dans :** [Médecine](#)
- **Partager :**
 - [Facebook](#)
 - [Viadeo](#)
 - [Twitter](#)
 - [Wikio](#)

[Médecine](#)

URL source: <https://www.rtflash.fr/tabagisme-passif-est-toujours-dangereux-pour-arteres/article>